

VAKSINASI: APA ANDA PERLU TAHU

SIAPA YANG PATUT AMBIL VAKSIN COVID-19



- Berumur 18 dan ke atas boleh divaksinasi
- Komorbid* adalah berisiko tinggi untuk mengalami kesan yang teruk daripada COVID-19 sekiranya dijangkiti
- Oleh kerana itu, komorbid perlu divaksinasi untuk melindungi mereka dari mengalami kesan yang teruk daripada jangkitan

* Komorbid ditakrifkan sebagai orang yang mempunyai dua atau lebih penyakit/keadaan perubatan yang tidak berkaitan secara serentak


BOLEH DIVAKSINASI WALAUPUN DI DALAM KEADAAN...



Selepas kesakitan akut: Demam (divaksinasi 2 minggu selepas penyakit)



Selepas mendapat vaksin lain (2 minggu selepas divaksinasi)




Ibu menyusui



Alahan ringan: Makanan, ubat-ubatan, gigitan serangga (ruam, gatal, bengkak)



HIV: Keadaan stabil



Pesakit COVID-19 (divaksinasi 3-6 bulan selepas pulih)

KUMPULAN BERISIKO TINGGI YANG LAYAK UNTUK DIVAKSINASI


Senarai penyakit yang pengidapnya berisiko tinggi dan menjadi KUMPULAN UTAMA untuk divaksinasi




Diabetes: Sama ada jenis 1 atau 2



Obesiti: BMI >40 dan mempunyai penyakit yang berkaitan dengan obesiti




Hipertensi/ Darah tinggi



Hiper-kolesterolaemia



Penyakit jantung termasuk penyakit jantung kongenital, atrial fibrilasi, penyakit arteri koronari dan lemah jantung



Penyakit paru-paru: Asma, Penyakit Pulmonari Obstruktif Kronik (COPD)



Kanser (stabil dan telah selesai rawatan)



Hamil dengan komorbid: Boleh divaksinasi antara 14-33 minggu



Penyakit buah pinggang kronik: Tahap 3-5, menjalani dialisis



UNTUK
MAKLUMAT
LANJUT,
IMBAS KOD QR.

vaksinovid.gov.my

KONTRAIKANDIKASI* TERHADAP VAKSINASI

Terdapat beberapa keadaan yang menjadikan VAKSINASI TIDAK SESUAI, iaitu:


- ALERGI TERUK** dan **ANAFILAKSIS**, setelah menerima dos pertama vaksin COVID-19 (jangan ambil dos kedua)
- ALAHAN TERUK, ANAFILAKSIS** terhadap vaksin, ubat-ubatan atau bahan lain

Rujuk doktor...

- jika anda mempunyai alahan dan **TIDAK PASTI** mengenai **TAHAP ALAHAN** anda
- untuk **MEMBINCANGKAN JADUAL VAKSINASI** jika anda termasuk dalam salah satu kumpulan berisiko tinggi di bawah:
 - PENYAKIT BERKAITAN DARAH** termasuk mereka yang mengambil ubat seperti ubat pencairan darah
 - LEMAH SISTEM IMUN** disebabkan penyakit atau ubat-ubatan
 - Pesakit barah yang sedang menjalani rawatan
 - Penyakit autoimun: SLE dan artritis reumatoid yang mengambil ubat tertentu
 - Mengambil **STEROID** berterusan

* Kontraindikasi adalah gejala atau keadaan yang menjadikan sesuatu rawatan berisiko

LINDUNG DIRI,
LINDUNG SEMUA.



JAWATANKUASA KHAS JAMINAN AKSES
BEKALAN VAKSIN COVID-19 (JKJAV)